En condiciones ambientales que predisponen a:

Armillaria, Phytophthora	**TRICXS** Distribuido en la fila.
Roña, Alternaria	**PHYTALEX MZ**; **MANZIC MZ**; **MANZIC MZ + PHYTALEX MZ + SULPHAMIN**
Oidium	**SULPHAMIN**
Fuego bacteriano	**ANTYM SIMPLEX**
Áfidos, Ácaros, Eulia	**OLIVEG + SILIK EVO**
Cochinillas	**SILIK EVO**
Heladas de primavera	**SCUDOTHERM**
Excesos térmicos, Quemaduras	**SCUDOTHERM + BOOMERGY**

DOSIS DE APLICACIÓN

ANTYM simplex: 250-300 ml/hl (min. 2.5 L/ha)
BOOMERGY: 80-200 ml/hl (min. 0.8-1.5 L/ha)
MANZIC MZ: 250-300 ml/hl (min. 1.2-2.5 L/ha)
OLIVEG: 300-350 ml/hl (min. 2.0 L/ha)
PHYTALEX MZ: 250-300 ml/hl (min. 2.0 L/ha)
SCUDOTHERM: 1.2-2.0 L/hl (min. 3.5-5.0 L/ha)
SILIK EVO: 250-400 ml/hl (min. 2.5-4.0 L/ha)
SULPHAMIN: 150-300 ml/hl (min. 1.5 L/ha)
TRICXS: 2.5 kg/ha

*Los productos indicados no son pesticidas, son fertilizantes que, integrados en las estrategias de cultivo, permiten mejorar el estado nutricional de la planta y en consecuencia el rendimiento de la producción del cultivo. Las referencias a enfermedades están destinadas exclusivamente con el propósito de identificar una etapa vegetativa particular o situaciones climáticas / ambientales particulares que requieren estrategias de fertilización apropiadas.